

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry efekt leczenia, należy stosować lek Cravisol® ostrożnie i zgodnie z informacją zawartą w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustają należy skontaktować się z lekarzem.



## Cravisol®

płyn doustny  
100 ml

**Substancja czynna:** 100 ml preparatu zawiera:

wyciąg etanolowy ze świeżego kwiatostanu glogu (*Crataegi inflorescentiae recentis intractum*) 50 ml,  
wyciąg etanolowy ze świeżego liścia melisy (*Melissae herbae recentis intractum*) 35 ml,  
wyciąg etanolowy ze świeżego ziela jemioly (*Visci herbae recentis intractum*) 15 ml.

**Dostępne opakowania:** 100 ml leku w butelce szklanej.

**Podmiot odpowiedzialny:** PhytoPharm Kłęka SA, Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cravisol® i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Cravisol®
3. Jak stosować lek Cravisol®
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Cravisol®
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cravisol®

#### 1. Co to jest lek Cravisol® i w jakim celu się go stosuje

Cravisol® to płyn doustny. Substancją czynną leku stanowią wyciągi etanolowe ze: świeżego kwiatostanu glogu, świeżego liścia melisy, świeżego ziela jemioly. Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

#### **Wskazania do stosowania**

Produkt leczniczy tradycyjny przeznaczony do stosowania wspomagającego w łagodnych zaburzeniach pracy serca na tle nerwowym, również w okresie przekwitania u kobiet.

#### 2. Zanim zastosuje się lek Cravisol®

##### **Nie należy stosować leku Cravisol®**

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

**Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cravisol®**, dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 26 ml wina i 62 ml piwa.

Środki ostrożności dotyczą osób uzależnionych od alkoholu.

Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących oraz w grupach zwiększonego ryzyka, tj. u pacjentów z chorobami wątroby i w padaczkę.



### **Ciąża i laktacja**

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji. Lek zawiera 2,5 g etanolu w dawce jednorazowej. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

### **Stosowanie leku u dzieci**

Ze względu na wskazania i zawartość etanolu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Ze względu na zawartość alkoholu (2,5 g w 5 ml) nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w czasie stosowania leku Cravisol®, ponieważ alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w powietrzu wydychanym.

Lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową.

### **Stosowanie innych leków**

Dotychczas nie zanotowano interakcji z innymi lekami.

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę.

## **3. Jak stosować lek Cravisol®**

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować 4 razy dziennie po 5 ml preparatu w niewielkiej ilości wody.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku Cravisol® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.*

*W przypadku pominięcia dawki leku Cravisol® nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.*

*W przypadku zażycia większej dawki leku Cravisol® niż zalecana mogą wystąpić objawy związane z zawartością etanolu.*

Dotychczas nie zanotowano przypadków przedawkowania leku Cravisol®.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Dotychczas nie są znane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i poinformować o nich lekarza.

## **5. Przechowywanie leku**

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

*Nie należy stosować leku Cravisol® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.*

## **6. Inne informacje**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

PhytoPharm Kłęka SA

Kłęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska